

Radom, dnia 08 kwietnia 2025 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
Grzegorz Zaborski

Urzędy Miast i Gmin
terenu powiatu radomskiego

Nasz znak: PIW.R.ZO-I.5201.FMD.1.3.2025

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu w związku z aktualną sytuacją odnośnie pryszczycy bydła (FMD) na terenie Węgier i Słowacji związaną z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby przesyła w załączeniu ulotkę informacyjną Głównego Lekarza Weterynarii na temat pryszczycy.

Proszę o poinformowanie o powyższym producentów bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Radomiu
Grzegorz Zaborski

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna pryszczycy (FMD)



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Warzywna 20, 26-600 Radom
tel.: (48) 362-78-49, fax: (48) 362-78-49, e-mail: radom@piw.radom.pl, www.piw.radom.pl

Pryszczyca (FMD)


Choroba



Pryszczyca to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, koźląt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja




Pryszczyca jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek
dezynfekujący do
izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej. Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.